

LEBEN MIT DEM HI-VIRUS



HIV-STATISTIK WELTWEIT




- 19,5 Millionen Menschen (53%) hatten Zugang zu HIV-Medikamenten –erstmals mehr als die Hälfte.
- 2016 lebten weltweit ca. 37 Millionen Menschen mit HIV.
- Im Jahre 2015 gab es 1,8 Millionen Neuinfektionen (Tendenz : fallend)
- Eine Millionen Menschen starben im Jahr 2016 an den Folgen der HIV-Infektion.



HIV-STATISTIK DEUTSCHLAND

In Deutschland leben knapp 85.000 Menschen mit HIV/AIDS

Schätzungen des Robert Koch-Instituts zu HIV und AIDS in Deutschland im Jahr 2015



- In Deutschland lebten Ende 2015 rund 84.700 Menschen mit HIV.
- 60.700 nahmen HIV Medikamente.
- Ungefähr 3.200 Menschen infizierten sich 2015 neu.
- Ca.80% der infizierten sind Männer , der Rest Frauen und Kinder .
- Die Zahl der Neuinfektionen ist weitgehend stabil.
- Rund 460 Menschen starben 2014 an den Folgen ihrer HIV-Infektionen.
- 1.200 Menschen erhielten 2015 ihre Diagnose erst, nachdem sie bereits schwer erkrankt waren.
- Ca. 12.600 Menschen wissen nicht das Sie mit HIV infiziert sind .



ZIEL DER HIV ORGANISATION

Die HIV-Organisation der Vereinten Nationen UNAIDS will bis zum Jahr 2020 erreichen , dass :

- 90% der Infizierten von ihrer Infektion wissen
- 90% Zugang zu Medikamenten haben
- 90% der Therapierten unter der Nachweisgrenze sind (kein HIV mehr im Blut nachweisbar)

ZUSAMMENFASSUNG


- Ca. 40 Millionen Tote durch AIDS seit Beginn der Epidemie .
- 3 Millionen neue Infektionen pro Jahr das entspricht ca. 9000 Infektionen am Tag .
- Ca. 0,8 % der 15-49 jährigen sind infiziert .

- **UM EINE VERBREITUNG ZU VERMEIDEN !!! TESTEN LASSEN**



DIE ÜBERTRAGUNGSMÖGLICHKEITEN

HIV-DIAGNOSEN IN DEUTSCHLAND(2015)



- Homosexueller Kontakt
- Drogenkonsum
- Heterosexueller Kontakt
- Mutter-Kind Übertragung

- Durch ungeschützten vaginalen, analen, oder oralen Geschlechtsverkehr mit einer infizierten Person
- Benutzen der gleichen Spritze oder des gleichen Spritzbestecks mit einem infizierten Drogenabhängigen
- HIV-Positive schwangere Frau kann vor sowie während der Geburt ihr Kind mit dem Virus infizieren
- Durch Blutspende/Organspende einer mit HIV infizierten Person, jedoch in DE nicht möglich, da Spender auf HIV getestet werden



LEBEN MIT HIV

Die HIV Infektion ändert einiges im Leben. Falls die Diagnose positiv ist wird man regelmäßig Medikamente einnehmen müssen. Jedoch dank moderner Therapien kann die HIV Infektion so kontrolliert werden, dass sie sich nicht zu Aids entwickelt. Es ist also eine nicht heilbare, jedoch gut behandelbare Krankheit, wie auch Diabetes und Asthma. Mit einer gut verlaufenden Therapie und ärztlicher Behandlung ist mit einer normalen Lebenserwartung zu rechnen. Auch die Lebensqualität ist nur ein wenig eingeschränkt. Es ist also möglich trotz HIV Infektion ein ganz normales Leben zu führen.



WIR BEDANKEN UNS FÜR EURE
AUFMERKSAMKEIT

-Philipp, David,
Simon

